arXiv:1603.08979v1 [math.FA] 29 Mar 2016

ISOMORPHISMES ENTRE DES ESPACES DES MESURES À VALEURS VECTORIELLES

DAHER MOHAMMAD

ABSTRACT. Soient $(\Omega_1, \mathcal{F}_1, \mu_1)$ $(\Omega_2, \mathcal{F}_2, \mu_2)$ deux espaces de probabilités, $1 \leq p \leq +\infty$ et X un espace de Banach. Dans ce travail on montre que $L^p(\mu_1, X)$, $VB^p(\mu_1, X)$, $cabv(\mu_1, X)$ sont isomorphes aux $L^p(\mu_2, X)$, $VB^p(\mu_2, X)$, $cabv(\mu_2, X)$ respectivement, si $L^1(\mu_1)$ est fortement isomorphe à $L^1(\mu_2)$.

ABSTRACT. LET $(\Omega_1, \mathcal{F}_1, \mu_1)$, $(\Omega_2, \mathcal{F}_2, \mu_2)$ two probabilty spaces, $1 \leq p \leq +\infty$ and X a Banach space. In this work we show that $L^p(\mu_1, X)$, $VB^p(\mu_1, X)$, $cabv(\mu_1, X)$ are isomorphics to $L^p(\mu_2, X)$, $VB^p(\mu_2, X)$, $cabc(\mu_2, X)$ respectively, if $L^1(\mu_1)$ is strongly isomorphic to $L^1(\mu_2)$.

INRODUCTION.

Soient $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un espace de probabilté et X un espace de Banach dont le dual est noté X^*.

On note $L^p(\mu, \mathcal{F}, X) = L^p(\mu, X)$ l'espace des classes de fonctions: $\Omega \to X$, $\mathcal{F}$-fortement mesurables et de puissance $p - ième$ intégrable, $1 \leq p < +\infty$ (resp. bornées si $p = +\infty$).

$M(\Omega, X)$ désigne l'espace des mesures à variation bornée: $(\Omega, \mathcal{F}) \to X$, $cabv(\mu, \mathcal{F}, X) = cabv(\mu, X)$ désigne le sous-espace de $M(\Omega, X)$ formé des mesures ν absolument continues par rapport à μ.

$VB^p(\mu, \mathcal{F}, X) = VB^p(\mu, X)$, $1 < p \leq +\infty$, désigne l'espace des opérateurs $T : L^q(\mu) \to X$ (q est le conjugué de p) tels qu'il existe $g^T \geq 0$ dans $L^p(\mu)$, vérifiant

$$\|Tf\|_X \leq \int_\Omega |f(\omega)|\, g^T(\omega) d\mu(w),\ f \in L^q(\mu),$$

avec la norme

$$\|T\|_{VB^p(\mu,X)} = \inf \left\{ \left\| g^T \right\|_{L^p} \right\}.$$

$VB^\infty(\mu, X)$ coincide avec l'espace des opérateurs bornés: $L^1(\mu) \to X$.

Soit $\psi \in L^p(\mu, X)$. On définit l'opérateur $T_\psi : L^q(\mu) \to X$, par $T_\psi(f) = \int_\Omega f(\omega)\psi(\omega)d\mu(\omega)$, $f \in L^q(\mu)$. D'après [Dieu, lemme 2], [Du, p.98] l'opérateur: $\psi \in L^p(\mu, X) \to T_\psi \in VB^p(\mu, X)$ est un isométrie.

D'autre part, on a isométriquement $VB^p(\mu, X^*) = [L^q(\mu, X)]^*$, d'après l'identification entre $VB^p(\mu, X^*)$ et les mesures à $p-$variation bornée à valeurs dans X^* [Bl, p.349], [Din, chap.II-13-3, coroll.1].

Soient $\mathcal{F}'$ une sous-tribu de $\mathcal{F}$ et $p \in [1, \infty]$. On note $U^p_{\mathcal{F}'} : L^p(\mu) \to L^p(\mu, \mathcal{F}')$ l'opérateur définie par $U^p_{\mathcal{F}'}(f) = \mathbb{E}(f \mid \mathcal{F}')$, $f \in L^p(\mu)$. Nous rappelons que $U^p_{\mathcal{F}'}$ est un opérateur positif (contractant) sur $L^p(\mu)$, par conséquent $|U^p_{\mathcal{F}'} f| \leq U^p_{\mathcal{F}'} |f|$, presque-partout.

Soient Y un sous-espace de Banach de X et $x \in X$. On désigne par $[x]$ l'image de x dans l'espace quotient X/Y.

Pour tout $x \in X$ et tout $x^* \in X^*$ on note $(x, x^*) = x^*(x)$.

Soient I un ensemble et $\mathcal{U}$ un ultrafiltre sur I. Considérons l'espace $\ell^\infty(I, X)$ muni de la semi-norme suivante:

$$n((x_i)_{i\in I}) = \lim_{\mathcal{U}} \|x_i\|_X, \ (x_i)_{i\in I} \in \ell^\infty(I, X).$$

Notons $N = \{(x_i)_{i\in I} \in \ell^\infty(I, X);\ n((x_i)_{i\in I}) = 0\}$ et $X^I/\mathcal{U} = [(\ell^\infty(I, X))]/N$. D'après [St], $X^I/\mathcal{U}$ est un espace de Banach .

Dfinition 1. *Soit X, Y deux espaces de Banach. On dit que Y est finiment représentable dans Y, si pour tout sous-espace de Banach F de Y de dimension finie et tout $\varepsilon > 0$, il existe un sous-espace F_1 de X de dimension finie et un isorphisme $U : F \to F_1$ vérifiant $\|U\| \times \|U^{-1}\| \leq 1 + \varepsilon$.*

D'après [Beau], Y est finiment représentable dans Y si et seulement s'il existe un ensemble I et un ultrafiltre $\mathcal{U}$ sur I tel que Y se plonge isométriquement dans $X^I/\mathcal{U}$.

Proposition 1. *Il existe un ensemble I et un ultrafiltre $\mathcal{U}$ sur I tels que pour tout Banach X et tout $p \in]1, +\infty[$ il existe un opérateur d'isométrie $H : VB^p(\mu, X) \to [L^p(\mu, X)]^I/\mathcal{U}$ tel que $H\psi = \left[\widetilde{\psi}\right]$, pour toute $\psi \in L^p(\mu, X)$, où $\widetilde{\psi}(i) = \psi$, $\forall i \in I$.*

Démonstration.

Nous reprenons l'argument bien connu pour montrer que $L^q(\mu)$ a la propriété de l'approximation métrique.

Considérons $I = \{\mathcal{F}';\ \mathcal{F}'$est une sous-tribu finie de $\mathcal{F}\}$ ordonné par l'inclusion.

Désignons par $\mathcal{U}$ l'utrafiltre engendré par cette relation d'ordre. Soient $T \in VB^p(\mu, X)$ et $i \in I$. L'opérateur $T \circ U_i^q$ est du rang fini, donc il existe $\psi_i^T \in L^p(\mu, X)$ telle que $T \circ U_i^q(f) = \int\limits_\Omega f(\omega)\psi_i^T(\omega)d\mu(\omega)$ pour toute $f \in L^q(\mu)$.

Etape1: Montrons que pour tout $i \in I$, $\left\|\psi_i^T\right\|_{L^p(\mu,X)} \leq \|T\|_{VB^p(\mu,X)}$.

Il existe $g^T \geq 0$ dans $L^p(\mu)$ telle que $\|T\|_{VB^p(\mu,X)} = \left\|g^T\right\|_{L^p(\mu)}$ et $\|Tf\|_X \leq \int\limits_\Omega |f(\omega)|\, g^T(\omega)d\mu(\omega)$, $\forall f \in L^q(\mu)$. Il en résulte que

$$\begin{aligned} \|T \circ U_i^q f\|_X &\leq \int\limits_\Omega |U_i^q f(\omega)|\, g^T(\omega)d\mu(\omega) \leq \\ \int\limits_\Omega U_i^q |f|(\omega) g^T(\omega)d\mu(\omega) &= \int\limits_\Omega |f(\omega)| \left[(U_i^q)^*(g^T)\right](\omega)d\mu(\omega), \forall f \in L^q(\mu). \end{aligned}$$

Cela implique que $\left\|\psi_i^T\right\|_{L^p(\mu,X)} \leq \left\|(U_i^q)^* g^T\right\|_{L^p(\mu)} \leq \left\|g^T\right\|_{L^p(\mu)} = \|T\|_{VB^p(\mu,X)}$.

Etape 2: Montrons que pour toute $f \in L^q(\mu)$ $U_i^q f \underset{\mathcal{U}}{\to} f$ dans $L^q(\mu)$.

Soient $f \in L^q(\mu)$ et $\varepsilon > 0$. Il existe $\mathcal{F}' \in I$ et $f' \in L^q(\mu, \mathcal{F}')$ tels que $\|f' - f\|_{L^q(\mu)} < \varepsilon$, donc pour tout $i \geq \mathcal{F}'$ on a

$$\begin{aligned} \|U_i^q f - f\|_{L^q(\mu)} &\leq \|U_i^q f' - f\|_{L^q(\mu)} + \|U_i^q(f' - f)\|_{L^q(\mu)} \leq \\ \|f' - f\|_{L^q(\mu)} + \|f' - f\|_{L^q(\mu)} &\leq 2\varepsilon, \end{aligned}$$

car $U_i^q f' = f'$.

Etape 3: Montrons que $\|T\|_{VB^p(\mu,X)} \leq \lim_{\mathcal{U}} \left\|\psi_i^T\right\|_{L^p(\mu,X)}$.

Pour toute $f \in L^q(\mu)$ on a $T \circ U_i^q(f) = \int\limits_\Omega f(\omega)\psi_i(\omega)d\mu(\omega)$, donc $\|T \circ U_i^q(f)\|_X \leq \int\limits_\Omega |f(\omega)| \left\|\psi_i^T(\omega)\right\|_X d\mu(\omega)$. D'autre part, la suite $\left(\left\|\psi_i^T\right\|_X\right)_{i\in I}$ est bornée dans $L^p(\mu)$ d'après l'étape 1, par conséquent il existe $\varphi^T \in L^p(\mu)$ telle que $\left\|\psi_i^T\right\|_X \underset{\mathcal{U}}{\to} \varphi^T$ $\sigma(L^p(\mu), L^q(\mu))$. L'étape 2 nous montre que $T \circ U_i^q(f) \underset{\mathcal{U}}{\to} Tf$ dans X , donc $\|Tf\| \leq \int\limits_\Omega |f(\omega)|\, \varphi^T(\omega)d\mu(\omega)$, $\forall f \in L^q(\mu)$. On en déduit que $\|T\|_{VB^p(\mu,X)} \leq \left\|\varphi^T\right\|_{L^p(\mu)} \leq \lim_{\mathcal{U}} \left\|\psi_i^T\right\|_{L^p(\mu,X)}$.

Etape 4: Soit $\psi \in L^p(\mu, X)$. Montrons que $\psi_i^{T_\psi} \underset{\mathcal{U}}{\to} \psi$ dans $L^p(\mu, X)$.

Pour tout $i = \mathcal{F}' \in I$ et toute $f \in L^q(\mathcal{F}', \mu)$ on a

$$T_\psi \circ U_i^q(f) = \int_\Omega U_i^q(f)(\omega)\psi(\omega)d\mu(\omega) = \int_\Omega f(\omega)\psi(\omega)d\mu(\omega).$$

D'autre $T_\psi \circ U_i^q(f) = \int_\Omega f(\omega)\psi_i^{T_\psi}(\omega)d\mu(\omega)$, par conséquent pour toute $f \in L^q(\mathcal{F}', \mu)$ on a $\int_\Omega f(\omega)\psi(\omega)d\mu(\omega) = \int_\Omega f(\omega)\psi_i^{T_\psi}(\omega)d\mu(\omega)$, c'es- à-dire que $\psi_i^{T_\psi} = \mathbb{E}(\psi \mid \mathcal{F}')$. Donc $\psi_i^{T_\psi} \underset{\mathcal{U}}{\to} \psi$ dans $L^p(\mu, X)$.

On définit l'opérateur $V : VB^p(\mu, X) \to [L^p(\mu, X)]^I / \mathcal{U}$, par $VT = \left[(\psi_i^T)_{i\in I}\right]$. Il est évident d'après l'étape 4, que $V\psi = \left[\widetilde{\psi}\right]$ pour toute $\psi \in L^p(\mu, X)$.

Corollaire 1. *Pour tout Banach X, $VB^p(\mu, X)$ est finiment représentable dans $L^p(\mu, X)$.*

Proposition 2. *Il existe un ensemble I et un ultrafiltre $\mathcal{U}$ sur I tel que pour tout espace de Banach X, il existe un isométrie $H : cabv(\mu, X) \to [L^1(\mu, X)]^I / \mathcal{U}$ tel que $H\psi = \left[\widetilde{\psi}\right]$ pour toute $\psi \in L^1(\mu, X)$, où $\widetilde{\psi}(i) = \psi$, $\forall i \in I$.*

Démonstration.

Soit $\nu \in cabv(\mu, X)$. Pour tout $i \in I = \{\mathcal{F}'; \mathcal{F}'$ est une tribu finie de $\mathcal{F}\}$ notons $\nu_i = \nu_{|_i} \in cabv(i, \mu, X)$. Il existe $f_i \in L^1(i, \mu, X)$ qui représente la mesure ν_i. Il est évident que $\lim_{\mathcal{U}} \|f_i\|_{L^1(\mu,X)} \leq \|\nu\|$.

Montrons l'inégalité inverse.

Comme $|\nu|$ est absoluement continue par rapport à μ, il existe une densité $g \in L^1(\mu)$ telle que $d|\nu| = gd\mu$. Fixons $\varepsilon > 0$. Il existe des sous-ensembles $B_1, ..., B_n$ de $\mathcal{F}$ tel que $\|\nu\| = |\nu|(\Omega) < \sum_{i\leq n} \|\nu(B_i)\| + \varepsilon \leq |\nu_i(\Omega)| + \varepsilon$, où i est la tribu engendrée par $B_1, ..., B_n$. Il en résulte que $\|\nu\| = |\nu|(\Omega) < |\nu_i(\Omega)| + \varepsilon \leq \|f_i\|_{L^1(\mu,X)} + \varepsilon = \|f_{i'}\|_{L^1(\mu,X)} + \varepsilon$ pour tout $i' \geq i$. Donc on a l'inégalité inverse, par conséquent V est un isométrie.

Soient $\psi \in L^1(\mu, X)$ et $i = \mathcal{F}'$. On remarque que $\psi_i = \mathbb{E}(f \mid \mathcal{F}')$, ceci implique que $\psi_i \to \psi$ dans $L^1(\mu, X)$, c'est-à-dire $V\psi = \left[\widetilde{\psi}\right]$. ■

Corollaire 2. *Pour tout Banach X, $cabv(\mu, X)$ est finiment représentable dans $L^1(\mu, X)$.*

Corollaire 3. *Pour tout Banach X, $M(\Omega, X)$ est finiment représentable dans $L^1(\mu, X)$.*

Démonstration.

Soit E un espace de dimension finie dans $M(\Omega, X)$. Il existe une mesure μ positive telle que E se plonge isométriquement dans $cabv(\mu, X)$. Pour conclure, il suffit d'appliquer le corollaire 2.

Dfinition 2. *Soient $(\Omega_1, \mathcal{F}_1, \mu_1)$,$(\Omega_2, \mathcal{F}_2, \mu_2)$ deux espaces de probabilités. On dit que $L^1(\mu_1)$ est fortement isomorphe à $L^1(\mu_2)$, s"il existe un isomorphisme $U : L^1(\mu_1) \to L^1(\mu_2)$ tel que $U^* \circ U = I_{L^\infty(\mu_1)}$.*

Proposition 3. *Soient $(\Omega_1, \mathcal{F}_1, \mu_1)$,$(\Omega_2, \mathcal{F}_2, \mu_2)$ deux espaces de probabiltés et X un espace de Banach. Supposons que $L^1(\mu_1)$ soit fortement isomorphe à $L^1(\mu_2)$. Alors*

I) $L^p(\mu_1, X)$ est isomorphe à $L^p(\mu_2, X)$, pour tout $1 \leq p \leq \infty$.
II) $VB^p(\mu_1, X)$ est isomorphe à $VB^p(\mu_2, X)$, pour tout $1 < p \leq \infty$.
II) $cabv(\mu_1, X)$ est isomorphe à $cabv(\mu_2, X)$.

Démonstration.

I).

Comme $L^1(\mu_1, X) = L^1(\mu_1)\widehat{\otimes}X$ et $L^1(\mu_2, X) = L^1(\mu_2)\widehat{\otimes}X$, alors $L^1(\mu_1, X)$ est isomorphe à $L^1(\mu_2, X)$. En remplaçant X par X^* on a $L^1(\mu_1, X^*)$ est isomorphe à $L^1(\mu_2, X^*)$, par dualité on voit que $[L^1(\mu_1, X^*)]^*$ est isomorphe à $[L^1(\mu_2, X^*)]^*$.

Observons que $L^1(\mu_1, X)$ et $[L^1(\mu_1, X^*)]^*$ se plongent continûment dans $[L^\infty(\mu_1, X^*)]^*$, par conséquent $(L^1(\mu_1, X), [L^1(\mu_1, X^*)]^*)$ est un couple d'interpolation au sens de [Ber-Lof].

Etape 1: Soit $f \in$. Montrons que $L^1(\mu_1, X) \cap [L^1(\mu_1, X^*)]^* = L^\infty(\mu_1, X)$.

Il est clair que $L^\infty(\mu_1, X) \subset L^1(\mu_1, X) \cap [L^1(\mu_1, X^*)]^*$. Montrons l'inclusion inverse.

Soit $f \in L^1(\mu_1, X) \cap [L^1(\mu_1, X^*)]^*$. Il existe $u \in [L^1(\mu_1, X^*)]^*$ telle que $\langle f, g\rangle = \langle u, g\rangle$ pour toute $g \in L^\infty(\mu_1, X^*)$. Il en résulte qu'il existe une constante $C_f > 0$ telle que pour toute $g \in L^\infty(\mu_1 X^*)$

$$|\langle f, g\rangle| \leq C_f \|g\|_{L^1(\mu_1,, X^*)}. \tag{0.1}$$

Soient X_1 un sous-espace de Banach séparable de X tel que f est $\mu_1 - presque - partout$ à valeurs dans X_1 et $(x_j^*)_{j\geq 0}$ une suite préfaiblement dense dans la boule unité de $(X_1)^*$.

Notons pour tout $j \in \mathbb{N}$ $h_j = (f, x_j^*)$. D'après (0.1), pour toute $r \in L^\infty(\mu_1)$ nous avons

$$|\langle h_j, r\rangle| = \left|\left\langle f, r \otimes x_j^*\right\rangle\right| \leq C_f \left\|r\right\|_{L^1(\mu_1)}. \tag{0.2}$$

La relation (0.2) nous montre que $\left|\left\langle f(\omega), x_j^*\right\rangle\right| \leq C_f$ pour presque tout $\omega \in \Omega_1$, donc $\left\|f(\omega)\right\|_X = \sup_{j\geq 0}\left|f\left\langle(\omega), x_j^*\right\rangle\right| \leq C_f$ pour presque tout $\omega \in \Omega_1$. Cette inégalité implique que $f \in L^\infty(\mu_1, X)$.

Considérons $F_1 : L^1(\mu_1, X) \to L^1(\mu_2, X)$ l'isomorphisme tel que $F_1 f \otimes x = Uf \otimes x$, $f \in L^1(\mu_1), x \in X$ et $F_2 : L^1(\mu_1, X^*) \to L^1(\mu_2, X^*)$ l'isomorphisme tel que $F_2(f \otimes x^*) = Uf \otimes x^*$, $f \in L^1(\mu_1)$, $x^* \in X^*$.

Etape 2: Soit $f \in L^1(\mu_1, X) \cap [L^1(\mu_1, X^*)]^*$. Montrons que $[(F_2)^*]^{-1} f = F_1(f)$.

Il suffit de montrer que $\left\langle [(F_2)^*]^{-1} f, F_2(g\right\rangle = \langle F_1 f, F_2 g\rangle$ pour toute $g \in L^\infty(\mu_1) \otimes X^*$.

Considérons $g = h \otimes x^*$, $h \in L^\infty(\mu_1)$, $x^* \in X^*$. Il est clair que

$$\left\langle [(F_2)^*]^{-1} f, F_2(h \otimes x^*\right\rangle = \langle f, h \otimes x^*\rangle \tag{0.3}$$

.

Supposons que $f = \sum_{k\leq n} f_k \otimes x_k \in L^\infty(\mu_1) \otimes X$. Observons que

$$\begin{aligned}
\langle F_1(f), F_2(g \otimes x^*\rangle &= \sum_{k\leq n} \langle F_1 f_k \otimes x_k, Uh \otimes x^*\rangle \\
&= \sum_{k\leq n} \langle Uf_k \otimes x_k, Uh \otimes x^*\rangle = \sum_{k\leq n} \langle (U^* \circ Uf_k) \otimes x_k, h \otimes x^*\rangle \\
&= \sum_{k\leq n} \langle f_k \otimes x_k, h \otimes x^*\rangle = \left\langle \sum_{k\leq n} f_k \otimes x_k, h \otimes x^* \right\rangle \\
&= \langle f, h \otimes x^*\rangle .
\end{aligned}$$

Donc

$$\langle F_1(f), F_2(g \otimes x^*\rangle = \langle f, h \otimes x^*\rangle \tag{0.4}$$

Soit maintenant $f \in L^\infty(\mu_1, X)$. Il existe une suite $(f_n)_{n\geq 0}$ dans $L^\infty(\mu_1) \otimes X$ telle que $f_n \underset{n\to+\infty}{\to} f$ fortement dans $L^1(\mu_1, X)$. D'après (0.3) et (0.4) $\langle F_1(f_n), F_2(g \otimes x^*\rangle = \langle f_n, h \otimes x^*\rangle$. D'autre part,

$\langle F_1(f_n), F_2(h \otimes x^*\rangle = \langle f_n, (F_1)^* F_2 h \otimes x^*\rangle \underset{n\to+\infty}{\to} \langle f, (F_1)^* F_2 h \otimes x^*\rangle =$ $\langle F_1(f), F_2(h \otimes x^*\rangle$ et $\langle f_n, h \otimes x^*\rangle \to \langle f, h \otimes x^*\rangle$. Par conséquent $\left\langle [(F_2)^*]^{-1} f, F_2(h \otimes x^*\right\rangle =$ $\langle F_1 f, F_2 h \otimes x^*\rangle$.

Il en résulte que pour toute $f \in L^1(\mu_1, X) \cap [L^1(\mu_1, X^*)]^*$ et toute $g \in L^\infty(\mu_1) \otimes X^*$ $\left\langle [(F_2)^*]^{-1} f, F_2 g\right\rangle = \langle F_1(f), F_2 g\rangle$.

Soient maintenant $p \in]1, +\infty[$ et $\theta = 1/p$. D'après [Ber-Lof, th.4.7.2] et l'étape 1 on a

$$\begin{aligned}(L^1(\mu_1, X), \left[L^1(\mu_1, X^*)\right]^*)_\theta &= \\ (L^1(\mu_1, X), L^1(\mu_1, X) \cap \left[L^1(\mu_1, X^*)\right]^*)_\theta &= \\ & (L^1(\mu_1, X), L^\infty(\mu_1, X))_\theta.\end{aligned}$$

En utilisant [Ber-Lof, th.5.2.1] on voit que $(L^1(\mu_1, X), L^\infty(\mu_1, X))_\theta = L^p(\mu_1, X)$. Par conséquent

$$(L^1(\mu_1, X), L^1(\mu_1, X) \cap \left[L^1(\mu_1, X^*)\right]^*)_\theta = L^p(\mu_1, X). \tag{0.5}$$

De même on a

$$(L^1(\mu_2, X), L^1(\mu_2, X) \cap \left[L^1(\mu_2, X^*)\right]^*)_\theta = L^p(\mu_2, X). \tag{0.6}$$

D'autre part d'après l'étape 2 $(L^1(\mu_1, X), L^1(\mu_1, X) \cap [L^1(\mu_1, X^*)]^*)_\theta$ est isomorphe à $(L^1(\mu_2, X), L^1(\mu_1, X) \cap [L^1(\mu_2, X^*)]^*)_\theta$ isomorphiquement. D'après (0.5) et (0.6), $L^p(\mu_1, X) = L^p(\mu_2, X)$ isomorphiquemet.Finalement d'après l'étape 2 $L^\infty(\mu_1, X)$ est isomorphe à $L^\infty(\mu_2, X)$.■

II).

Notons $I = \{\Sigma_1; \Sigma_1 \text{ est une sous-tribu finiede} \mathcal{F}_1\}$.

Soient $p \in]1, \infty]$ et $U : L^q(\mu_1) \to L^q(\mu_2)$, $F_q : L^q(\mu_1, X) \to L^q(\mu_2, X)$ deux isomorphismes. Fixons $T \in VB^p(\mu_1, X)$. D'après l'étape 2 de la proposition 1, il existe une suite de martingale $(\psi_{i,T})_{i \in I}$ $L^q -$ *bornée* à valeurs dans X telle que $\lim_{\mathcal{U}} \int\limits_{\Omega_1} f(\omega_1)\psi_{i,T}(\omega_1)d\mu_1(\omega_1)$ existe pour tout $f \in L^q(\mu_1)$.

Soit $f \in L^q(\mu_2)$. Montrons que $\lim_{\mathcal{U}} \int\limits_{\Omega_2} f(\omega_2)F_q\psi_{i,T}(\omega_2)d\mu_2(\omega_2)$ existe.

Il existe $B_1, ..., B_n \in i,\ x_1, ..., x_n \in X$ tel que $\psi_{i,T} = \sum_{k\leq n} \mathcal{X}_{B_k} \otimes x_k$,

donc $F_q\psi_{i,T} = \sum_{k\leq n} U\mathcal{X}_{B_k} \otimes x_k$. On a alors

$$\begin{aligned}\int_{\Omega_2} f(\omega_2)F_q\psi_{i,T}(\omega_2)d\mu_2(\omega_2) &= \int_{\Omega_2} f(\omega_2)\sum_{k\leq n} U\mathcal{X}_{B_k}(\omega_2)\otimes x_k d\mu_2(\omega_2)\\ &= \int_{\Omega_1} U^*f(\omega_1)\sum_{k\leq n}\mathcal{X}_{B_k}(\omega_1)\otimes x_k d\mu_1(\omega_1)\\ &= \int_{\Omega_1} U^*f(\omega_1)\psi_{i,T}(\omega_1)d\mu_1(\omega_1).\end{aligned}$$

Donc $\lim_{\mathcal{U}} \int_{\Omega_2} f(\omega_2)F_q\psi_{i,T}(\omega_2)d\mu_2(\omega_2)$ existe. On définit l'opérateur $L_T : L^q(\mu_2) \to X$, par

$$L_T(f) = \lim_{\mathcal{U}} \int_{\Omega_2} f(\omega_2)F_q\psi_{i,T}(\omega_2)d\mu_2(\omega_2)\ , f \in L^q(\mu_2).$$

Soit $T \in VB^p(\mu_1, X)$. D'après l'étape 1 de la proposition 1 $\|L_T\|_{VB^p(\mu_2,X)} \leq \lim_{\mathcal{U}} \left\|F_q\psi_{i,\psi}\right\|_{L^q(\mu_2,X)} \leq \|F_q\| \times \|T\|_{VB^p(\mu_2,X)}$.

Définissons l'opérateur $G : VB^p(\mu_1, X) \to VB^p(\mu_2, X)$, par $G(T) = L_T$, $T \in VB^p(\mu_1, X)$. Il est clair que G est injectif et surjectif. Comme il est continue G est un isomorphisme.

III).

D'après [Din], il existe un compact de Hausdorff K_l et une mesure de probabilité α_l sur K_l, $l = 1, 2$ tels que $L^1(\mu_l, X) = L^1(K_l, \alpha_l, X)$ et $cabv(\mu_l, X) = cabv(K_l, \alpha_l, X)$ isométriquement, $l = 1, 2$. On peut donc supposer que Ω_1 et Ω_2 sont des compacts de Hausdorff

Soient maintenant $U : L^1(\mu_1) \to L^1(\mu_2)$ et $F_1 : L^1(\mu_1, X) \to L^1(\mu_2, X)$ les deux isomorphismes précédents. Choisissons $\nu \in cabv(\mu, X)$. La démonstartion de la proposition 2 nous montre qu'il exisite une suite de matringale $(\psi_{i,\nu})_{i\in I}$ $L^1 - bornée$ à valeurs dans X telle que $\|\nu\| = \lim_{\mathcal{U}} \left\|\psi_{i,\nu}\right\|_{L^1(\mu,X)}$.

On définit l'opérateur $L_v : C(\Omega_2) \to X$, par $L_\nu(f) = \lim_{\mathcal{U}} \int_{\Omega_2} f(\omega_2) F_q \psi_{i,\nu}(\omega_2) d\mu_2(\omega_2)$ (par un argument analogue à celui de II, on montre que $\lim_{\mathcal{U}} \int_{\Omega_2} f(\omega_2) F_q \psi_{i,\nu}(\omega_2) d\mu_2(\omega_2)$ existe).

Etape 1*:* Montrons que L_ν est un opérateur 1-sommant.

Il existe une mesure positive β_ν sur Ω_2 telle que $\left\|F_q\psi_{i,\nu}\right\|_X d\mu_2 \underset{\mathcal{U}}{\to} \beta_\nu$ $\sigma(M(\Omega_2), C(\Omega_2))$. On a alors

$$\|L_\nu f\|_X \leq \lim_{\mathcal{U}} \int_{\Omega_2} |f(\omega_2)| \left\|F_q\psi_{i,\nu}(\omega_2)\right\|_X d\mu_2(\omega_2) = \int_{\Omega_2} |f(\omega_2)| \, d\beta_\nu(\omega_2).$$

Ceci entraîne que L_ν est 1-sommant.

Notons a_ν la mesure défini par L_ν. D'après [Du] $\alpha_\nu \in M(\Omega_2, X)$.

Etape 2*:* Montrons que $\alpha_\nu \in cabv(\mu_2, X)$.

Il suffit de montrer que pour tout $x^* \in X^*$, (L_T, x^*) est absolument continue par rapport à μ_2.

Soit $x^* \in X^*$. Remarquons par la construction de F_q que pour tout $i \in I$ $(F_q\psi_{i,\nu}, x^*) = (U\left[(\psi_{i,\nu}, x^*)\right]$. Ceci implique que

$$\begin{aligned}(L_\nu f, x^*) &= \lim_{\mathcal{U}} \int_{\Omega_2} f(\omega_2)(F_q\psi_{i,\nu}(\omega_2), x^*) d\mu_2(\omega_2) \\ &= \lim_{\mathcal{U}} \int_{\Omega_2} f(\omega_2) U(\psi_{i,\nu}, x^*)(\omega_2) d\mu_2(\omega_2).\end{aligned}$$

D'autre part, $(\nu, x^*) \in L^1(\mu_1)$, donc $(\psi_{i,\nu}, x^*) \underset{\mathcal{U}}{\to} (\nu, x^*)$ dans $L^1(\mu_1)$.

D'après ce qui précède, on a

$$(L_\nu f, x^*) = \int_{\Omega_2} f(\omega_2) U(\nu, x^*)(\omega_2) d\mu_2(\omega_2),$$

il en résulte que pour tout $A \in \mathcal{F}_2$, on a

$$(L_\nu(A), x^*) = \int_A U(\nu, x^*)(\omega_2) d\mu_2(\omega_2).$$

On déduit que (L_ν, x^*) est absolument continue par rapport à μ_2.

Par un argument analogue à celui de II, on montre que lopérateur $\nu \in cabv(\mu_1, X) \to L_\nu \in cabv(\mu_2, X)$ est un isomorphisme.■

References

[Beau] **B. Beauzamy,** *Introduction to Banach spaces and their geometry, North Holland, 1985.*

[Bl] **B. Blasco,** *Boundary values of functions in vector valued Hardy spaces and geomerty of Banach spaces, J. Funct. Anal. 78, n°.2, 346-364, (1988).*

[Ber-Lof] **J. Bergh et J. Lofstrom,** *Interpolation spaces an introduction, Springer-Verlag-Berlin-Heidelberg, New-York, (1976).*

[B-D] **A. V. Bukhvaov et A. A. Danilevich,** *Boundary properties of analytic and harmonic functions with values in Banach spaces, Math. Notes; 31, 104-110, (1989).*

[Dieu] J. **Dieudonné,** *Sur le thérème de Lebesgue-Nikodym V, Canad J. of Math 3, 129-139, (1951).*

[Du] **J. Diestel et J. J. Uhl,** *Vector measures, Math. Surveys 15, A. M. S, (1977).*

[Din] **N. Dinculennu,** *Vector measures, pergamon, New-York, (1967).*

[Dow] **P. N. Dowling,** *A stability property of classes of Banach spaces not containing c_0 Canad. Math. Bull. 35, 56-60, (1992).*

[Dre-Em] **L. Drewnowski et G. Emmanuele,** *The problem of complementability for some spaces of vector measures of bounded variation with values in Banach spaces containing copies of c_0, Stud. Math. 104, (2), 111-123, (1993).*

[Em] **G. Emmanuele,** *Remaks on the complementability of spaces Bochner integrable functions in space of vector measures, Comment. Math. Univ. Carlinnae, 37, 217-228, (1996).*

[Fre-Rod] **F. Frenich et L. Rodriguez-Piazza,** *linear projections from a space of measures onto its Bochner integrable functions subspace, prepint, (1993).*

[Lin-Tz] **L. Lindenstrauss et L. Tzaffriri,** *Classical Banach spaces, Vol. II, Sringer, (1977).*

[R] **H. P. Rosenthal,** *On relativity disjoint families of measures with some application to space theory, Stud. Math. 37, 13-36, (1970).*

[Roy] **H. L. Royden,** *Real analysis, Macmillan, (1988).*

[St] **J. Stern,** *Ultrapowers and local properties of Banach space, Trans. A. M. S. Vol. 240, 31-25, (1978).*

m.daher@orange.fr

E-mail address: m.daher@orange.fr